

Dentre as variáveis mais importantes para avaliar a história natural do alcoolismo, destacam-se a idade de início dos problemas relacionados com o uso do álcool, a característica de personalidade procura de novidades, e a suscetibilidade ao estresse. Pouco se sabe sobre a relação entre tais variáveis e a presença de transtornos psiquiátricos no paciente ou familiares. Os objetivos deste trabalho são verificar se alcoolistas com pelo menos um transtorno psiquiátrico adicional apresentam características específicas de personalidade, e se tais indivíduos também apresentam um número maior de parentes afetados por problemas psiquiátricos. Estudamos 81 indivíduos através do Formulário Semi-Estruturado para a Genética do Alcoolismo (SSAGA). Os 41 portadores de pelo menos uma patologia adicional foram comparados com 39 alcoolistas portadores de alcoolismo isolado quanto a procura de novidades, suscetibilidade ao estresse, idade de início do agrupamento de problemas relacionados com o álcool e o número de parentes de primeiro grau afetados por patologias psiquiátricas. Os alcoolistas portadores de comorbidade apresentaram escores mais elevados em procura de novidades, que caracteriza os alcoolistas do tipo 2. O fato de que as demais associações resultaram não significativas sugere que a comorbidade em si não influencia as variáveis estudadas.