

**REVISÃO DO GÊNERO *Hemiancistrus*, BLEEKER, 1862 NO SUL DO BRASIL (TELEOSTEI: SILURIFORMES).** *Alexandre Rodrigues Cardoso, Luiz Roberto Malabarba* (Laboratório de Ictiologia do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS).

Fowler (1954) listou quinze espécies de *Hemiancistrus* para todo o Brasil. Destas, somente uma foi listada para o sul da América do Sul, *Hemiancistrus itacua*, que tem como localidade-tipo os afluentes do rio de La Plata (Isbrücker, 1980). Malabarba (1989), em seu trabalho de revisão dos peixes de água doce ocorrentes no sistema da Laguna dos Patos, cita uma espécie não identificada do gênero para esta drenagem. As análises preliminares dos dados morfométricos e merísticos realizadas no material depositado na coleção Ictiológica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCP), mostraram que, provavelmente, exista mais de uma espécie de *Hemiancistrus* ocorrendo no sul do Brasil. Existe, portanto, a necessidade de uma revisão taxonômica das espécies do gênero, incluindo as drenagens costeiras dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, rio Uruguai e sistema da laguna dos Patos.