

020

FATORES ASSOCIADOS À ASMA AGUDA EM PACIENTES ADMITIDOS NA EMERGÊNCIA DO HCPA. *Menna-Barreto, S. S; Oliveira, P. P; Vidor, A. C; Bacha, O. M; Vidal, R. M; Toniolo, D. P; Luz, L. P.*

A asma é uma das doenças mais freqüentes em qualquer faixa etária, sendo que sua prevalência pode variar entre 5-10%. Todos os pacientes com este diagnóstico correm o risco de desenvolvimento de crises severas, as quais são fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência respiratória. Estudos recentes sugerem que há uma associação entre os sintomas e a história pregressa do quadro com a severidade e prognóstico da crise asmática. Desta forma, elaborou-se um estudo de coorte com enfoque prognóstico, onde procurou-se estabelecer associação entre os fatores associados às crises e seu desfecho clínico em todos os pacientes com menos de 55 anos internados na sala de observação do HCPA, pelo período de 1996/97. Os pacientes foram alocados a partir dos boletins de atendimento, onde respondiam a um questionário após consentimento formal e tinham seus dados coletados e analisados. Sendo assim, pôde-se estabelecer algumas associações entre os fatores desencadeantes e a qualidade das crises.