

PRESENÇA E EXTENSÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE: ORIENTAÇÃO FAMILIAR

KINDLEIN, KA*, BALBINOT, JH**

Departamento de Odontologia Preventiva e Social

* Katherine de Andrade Kindlein, estudante de graduação da Faculdade de Odontologia UFRGS

** Professora da Faculdade de Odontologia UFRGS

INTRODUÇÃO

A atenção primária em saúde (APS) constitui a principal estratégia de organização da atenção à saúde. É considerada essencial para a efetividade do sistema e para garantir melhorias nas condições de saúde da população. Dentre seus atributos secundários, a orientação familiar caracteriza-se pelo cuidado em saúde bucal observando o contexto e histórico familiar, fatores de risco comum e condições de vida do sujeito.

OBJETIVO

Avaliar a relação entre o atributo orientação familiar e modelo de atenção primária de usuários dos serviços de atenção básica de Porto Alegre.

METODOLOGIA

- Entrevista com usuários de 15 unidades de saúde de Porto Alegre, selecionadas a partir de três modelos de atenção primária: Estratégia de Saúde da Família-ESF; Unidade de Saúde Tradicional-US e Unidades de Saúde do Grupo Hospitalar Conceição-GHC.
- Amostragem foi aleatória, realizada através do sorteio dos setores censitários dos territórios de abrangência de cada unidade.
- Foi aplicado um questionário constituído pelo PCATool Brasil dirigido à Saúde Bucal Versão Usuário, para avaliar a presença e extensão dos atributos da APS.
- Foi utilizado o software SPSS para análise de dados, teste do qui-quadrado para as variáveis categóricas.

RESULTADOS

Quanto às variáveis que abordam se o Dentista questiona sobre o histórico de doença ou problemas em comum da família e sobre a opinião do usuário no plano de tratamento, esteve mais presente na ESF e GHC, porém sem diferença estatisticamente significativa ($p=0,24$). Já, no que diz respeito ao fato de o Dentista se reunir com os familiares do usuário quando houver necessidade, as respostas foram mais positivas para ESF e GHC com diferenças estatisticamente significativa ($p=0,00$).

CONCLUSÃO

Conclui-se que o atributo da orientação familiar está mais presente nos modelos de atenção primária do tipo ESF e GHC, em detrimento das US tradicionais.