

**1215**

**INCIDÊNCIA DE HÉRNIA EM PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ABERTA NO HCPA**

Ivan Alberto Zepeda Mejia, Manoel Roberto Maciel Trindade, Vinicius von Diemen, Joao Vicente Grossi, Eduardo Neubarth Trindade, Adriana Martin, Martina Becker, Felipe Fernandes Nicola, Tassio Crusius, Tales Pires. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

**Objetivo:** Avaliar a incidência de hérnia incisional (HI) em pacientes com obesidade mórbida que realizaram cirurgia bariátrica aberta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). **Introdução:** Tratamento cirúrgico para a obesidade mórbida (OM) é o tratamento de escolha para pacientes com índice de massa corporal maior que 40 Kg/m<sup>2</sup> ou maior que 35kg/m<sup>2</sup> nos portadores de comorbidades. Sabe-se que uma parte de pacientes irá desenvolver hérnia incisional no pós-operatório nas cirurgias abertas. A incidência de hérnia incisional em pacientes que realizaram cirurgia abdominal é de 10-15% e em pacientes com fatores de risco elevados esse número chega a atingir 30%. **Método:** Estudo de coorte retrospectivo, com 259 pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica no HCPA a partir de janeiro de 2008 até fevereiro de 2014. Os dados foram coletados nos prontuários dos pacientes do ambulatório de cirurgia digestiva do HCPA. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa IBM SPSS statistics 20. **Resultados:** Dos 259 pacientes operados, 86,1% eram do sexo feminino. Houve uma incidência de 19,7% de hérnia incisional nos pacientes. Tempo médio de surgimento foi de 362 dias. A incidência foi maior nos pacientes que tinham uma idade maior que 40 anos, com 57% no momento do diagnóstico (P 0,002) e nos pacientes que tiveram infecção da FO (P 0,017) com 5% de taxa de ISC vs 1,5%. Houve uma maior taxa de hernia incisional, sem significancia estatistica, que tinham sido submetidos a cirurgia abdominal prévia (P 0,072). Sexo, raça, tabagismo, local da incisão cirúrgica, uso de corticóide não apresentaram diferença significativa. **Conclusões:** A incidência de hérnia incisional nos obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica foi maior quando comparado à população geral, mas menores que a estimativa da literatura. Os fatores de risco associados a incidência de hérnia incisional neste grupo de pacientes foram a idade avançada e a infecção da FO. **Palavra-chave:** Obesos mórbidos; hérnia incisional; incidência pós-operatória.