

*Lopes-Pitoni*, (Malacologia MCN-FZB, Porto Alegre).

Como contribuição ao estudo das espécies do gênero Drymaeus Albers, 1850, de habitat terrestre, ocorrentes no sul do Brasil, verificou-se a representação de exemplares deste gênero na Coleção de moluscos "Eliseo Duarte", a qual documenta em sua maior parte a malacofauna marinha e continental do Cone Sul. Estão representadas as seguintes espécies do subgênero Drymaeus Albers, 1850: D. angulobasis Pilsbry, 1944; D. expansus (Pfeiffer, 1848); D. flexuosus (Pfeiffer, 1853); D. hygrophilaeus (Orbigny, 1835); D. lynchi Parodiz, 1946; D. papyraceus (Mawe, 1823); D. papyraceus papyrifactus Pilsbry, 1898; D. poecilus (Orbigny, 1835); D. scitulus (Reeve, 1849); D. strigatus (Sowerby, 1833). Do subgênero Mesembrinus Albers, 1850 está representada a espécie D. multilineatus (Say, 1825). Das espécies citadas na bibliografia como ocorrentes no sul do Brasil as representadas na coleção são: D. (D.) papyraceus e D. (D.) papyraceus papyrifactus. O gênero Drymaeus tem distribuição tropical e subtropical no norte e sul das Américas, segundo (Breure, 1979). (FZB, FAPERGS).