

Abcesso Subareolar Crônico Recidivante (ASCR) de  
Mama: Uma nova patogenia?

Alessandra Vogel Vidal de Oliveira, Márcia Edel\_  
weiss.

Departamento de Patologia FAMED-UFRGS e SAP-HCPA

O objetivo deste trabalho é correlacionar a presença de  
abcesso subareolar crônico recidivante com o hábito de fu  
mar.

Material e Métodos:

Foram revisados os diagnósticos de ASCR analisados no Ser\_  
viço de Patologia do HCPA no período de abril de 91 á a\_  
bril de 92. Dessa revisão obtiveram-se 13 casos que mos\_  
traram o diagnóstico em estudo. Os prontuários foram tam\_  
bém revisados e anotados, conforme o protocolo, a exist'anci\_  
a do hábito de fumar, idade e número de **gestações**.

A relação patogenética entre essa condição e a presença  
de ectasia ductal, bem como o diagnóstico diferencial com  
abcesso de mama foi considerada, sendo realizados exames  
complementares ao diagnóstico.

Observamos que em **53%** dos **casos** houve associação entre  
o hábito de fumar, 50% tinham mais de dois filhos e em  
75% a idade era superior a 30 anos.

A pesquisa está na sua fase inicial de coleta de dados,  
não tendo, portanto, conclusões definitivas.