

**P 3127**

**Resultados da Nursing Outcomes Classification para a avaliação de pacientes durante cessação do tabagismo**

Vanessa Monteiro Mantovani, Alba Luz Rodríguez Acelas, Amália de Fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida, Elizeth Heldt, Solange Klockner Boaz, Isabel Cristina Echer  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

**Introdução:** As dificuldades encontradas durante a cessação do tabagismo contribuem para a manutenção das taxas de prevalência, pois os sintomas de abstinência frequentemente levam os fumantes a desistir das tentativas de cessação. Por isso, torna-se fundamental o acompanhamento por enfermeiro, que realiza diversas intervenções direcionadas à cessação do tabagismo. Todavia, ainda se desconhece estudos que tenham utilizado a *Nursing Outcomes Classification* (NOC) para avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem realizadas neste cenário. **Objetivos:** Selecionar resultados da NOC e elaborar definições operacionais dos seus indicadores para avaliar pacientes durante cessação de tabagismo. **Métodos:** Estudo de consenso entre especialistas, realizado em hospital universitário no sul do Brasil, entre dezembro/2014 e março/2015, com participação de oito enfermeiros. Inicialmente, realizou-se um encontro para explicar aos participantes os objetivos do estudo e como este ocorreria. Nesse mesmo momento, resultados prioritários para a condição clínica em estudo foram pré-selecionados, posteriormente, elaborou-se um instrumento com esses resultados, seus indicadores e as opções “seleciono” e “não seleciono”. Este foi assinalado por cada enfermeiro no segundo encontro, quando os resultados e indicadores foram discutidos para se obter 100% de consenso. Por fim, elaboraram-se as definições operacionais para os indicadores selecionados considerando a magnitude das escalas Likert de cinco pontos, com base na literatura e experiência dos pesquisadores. **Resultados:** O resultado Comportamento de Cessação de Fumar (1625) foi selecionado com nove indicadores, como Expressão do desejo de parar de fumar (162501), Uso de estratégias para modificar o comportamento (162512) e Eliminação do uso do tabaco (162528). O resultado Gravidade da Retirada da Substância (2108) foi selecionado com 11 indicadores, como Desejo forte da substância (210802), Irritabilidade (210803) e Tremores (210811). As definições operacionais foram elaboradas para cada indicador, sendo que alguns indicadores foram agrupados no mesmo item devido à similaridade das definições construídas para cada um dos cinco pontos da escala Likert. **Conclusões:** O consenso permitiu selecionar resultados e indicadores da NOC para avaliação de pacientes durante cessação de tabagismo. Acredita-se que essa seleção auxiliará os enfermeiros a avaliar a qualidade da assistência prestada a esses pacientes, ao mesmo tempo em que proporcionará evidências científicas neste cenário de cuidado. **Palavras-chaves:** Abandono do uso de tabaco, processos de enfermagem, avaliação de resultados. Projeto 14-0528