

568 HERPES SIMPLES LABIAL. R Froner, M. Sant'Ana Fo.
(Departamento de Odontologia Conservadora, Faculdade de Odontologia, UFRGS).

Uma vez que 90% da população hospeda o vírus da doença, e sendo as lesões dolorosas cíclicas, visa este trabalho testar a eficiência do aciclovir tópico como forma terapêutica para atenuar as manifestações herpéticas.

Foi reunido um grupo de doze pacientes herpéticos, que responderam a um levantamento anamnético sobre a doença. Dois destes pacientes formavam um grupo controle, que recebeu por tratamento álcool metílico tópico cinco vezes diárias o qual não foi capaz de alterar o curso das lesões herpéticas quando comparado aos dados obtidos na anamnese. Os outros dez pacientes tiveram no total doze lesões tratadas com aciclovir tópico 5%, cinco vezes diárias. A medicação foi capaz de reduzir o tempo para formação de crosta em todas as lesões. Em dois casos, o tratamento pelo aciclovir iniciou-se com a lesão estabelecida, quando então não houve redução no tempo para cura. Quando o tratamento foi iniciado no pródromo, houve redução no tempo para cura em 50% das lesões (cinco lesões), conforme os dados comparativos à anamnese.

Ao haver formação de crosta os sintomas são reduzidos, o que torna o uso do aciclovir recomendável.