

141 FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA DO ADULTO (S.A.R.A.) Rogério E. E. Sarmiento Leite, Marcelo M. Matias, Sérgio Pinto Ribeiro, João Carlos Prolla e Rogério Xavier. (Departamento de Medicina Interna, Serviço de Pneumologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Revisaram-se 30 prontuários de pacientes do Centro de Tratamento Intensivo Clínico Cirúrgico do HCPA com o objetivo de testar fichas de protocolo para um trabalho prospectivo de avaliação prognóstica de pacientes com fatores de risco para SARA que se encontra em andamento. Os 30 casos foram selecionados a partir de diagnóstico principal de insuficiência respiratória aguda sem nenhum objetivo epidemiológico. Os principais fatores de risco encontrados foram: sepsis isolada (7 casos) e associada (9 casos); hipotensão isolada (4 casos) e associada (6 casos); pneumonia isolada (2 casos) e associada (3 casos); aspiração de conteúdo gástrico, circulação extracorporea, pancreatite, contusão pulmonar (1 caso), todos associados fatores; e um caso de politransusão sanguínea isolado.

do. A alta mortalidade encontrada (19 pacientes, e dos quais com SARA) confere com a literatura e recomenda uma maior investigação dos diferentes fatores de risco. (PROPESP)