

PREVALENCIA DE DISTURBIOS PSIQUICOS EM PACIENTES COM SINDROME DAS APNEIAS DO SONO DO TIPO OBSTRUTIVO (SASO). Martinez, Denis; Knorst, Marli M.; Silva, Grace C.; Canals, Aneron A; Beber, Larissa L.C.; Francisco, Ana C.(Laboratório do Sono da Santa Casa de Porto Alegre, Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Transtornos psíquicos são frequentes em pacientes com SASO. Entre populações de diferentes países existe ampla variação na prevalência destes transtornos, sugerindo possíveis efeitos genéticos, raciais ou sociais. Desenvolvemos o presente estudo para investigar a prevalência de distúrbios psíquicos em pacientes com SASO estudados no Brasil. Quarenta e sete pacientes portadores de SASO com média de idade de 47 ± 9 , seis do sexo feminino e 41 do sexo masculino foram comparados com um grupo controle formado por quarenta e oito indivíduos assintomáticos com média de idade de 36 ± 7 , 14 do sexo feminino e 34 do sexo masculino. Ambos os grupos responderam ao questionário "SCL-90" que avalia depressão (DEP), somatização (SOM), obsessividade-compulsividade (O-C), sensibilidade interpessoal (SI), ansiedade (ANS), hostilidade (HOS), fobias (FOB), paranóide (PAR) e psicoticismo (PSI). Utilizando o percentil 98 como limite da normalidade, o grupo de pacientes com SASO teve significantemente mais indivíduos com escores anormalmente elevados que o grupo controle exceto para O-C.

PERCENTAGENS DE ESCORES ANORMAIS NO SCL-90

	SOM	O-C	SI	DEP	ANS	HOS	FOB	PAR	PSI
Pac. SASO	24	12	27	27	32	17	22	19	15
controles	09	09	12	09	03	03	03	03	06

Os escores variavam de 0 a 4. Comparando-se as médias dos dois grupos para os diferentes escores, observamos significância em todos os distúrbios. Não obstante os instrumentos empregados serem diferentes, estes resultados são comparáveis aos observados por outros autores em pacientes de outras nacionalidades. (Financiado pelo CNPq)