ESTUDO CLÍNICO-PATOLÓGICO DA ENCEFALITE TOXOPLÁ\$1Ü-CA EM PACIB TES COM SIDA NO HCPA, L, Wolffenbüttelt 1·1, Wainstein, L,C, Ferreira, L. Golbsoan, r-1,Kronfel<

M, I. Edelweiss. (Depto. de Patologia - FAMED/UFRGS)

O objetivo do trabalho foi o de realizar uma correlação cl!nico-patológica da encefalite toxoplásmica (ET) em pacientes com SIDA no HCPA, Foram estudadas 97 necropsias em pacientes com SIDA, tendo sido identificados 11 casos 11, 296) com ence.falite por toxoplasma, Três padrões morfclogicos de toxoplasmose cerebral foram encontrados: (1) - áreas confluentes, bem definidas, denominadas de ET necros::mte; (2) - múltiplos abscessos focais bem delimitadosL (3) - múltiplos nódulos microgliais, Em todos foi efetuada à revisão de lâminas para pesquisa de taquizoitos intra/extracelulares e bradizoitos em cistos. Apõs o estudo das lâminas fora.'n efetuadss reações imu...Ylohistoqufmica\$ utiliza..."ldo anti corpo policional an titoxoplasms. Este teste revelou-se bas tante sens1vel para pesquisa de toxoplasma. Com relação aos uchauos C.::::..nlcos, os s1na1s neuro og.:tcos ...coca1s os mais suges ivos de ET. Dos pacientes com achados torr-ográficos sugestivDs de ET, 03 exames sorológicos forrxn positivos no lfquor em 93,3% e:w sangue 95,3%. A pesquisa encontrd-se em desenvolvimento e os resultados apresentados ato presente momento s50 parciais, (FAPZRGS)