



SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
XXVIII SIC

paz no plural



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2016: SIC - XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2016
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	Sintomas de Depressão em Crianças e Adolescentes vítimas de Abuso Sexual Intra e Extra Familiar na Região Sul do Brasil
<b>Autor</b>	NICOLE MICHAELA VOLKMANN
<b>Orientador</b>	CHRISTIAN HAAG KRISTENSEN

## SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL INTRA E EXTRA FAMILIAR NA REGIÃO SUL DO BRASIL

**Autor do resumo:** Nicole Michaela Volkmann

**Orientador:** Christian Haag Kristensen

**Instituição de Origem:** PUCRS

A ocorrência de maus tratos na infância é um fenômeno crescente em diversos países, constituindo um grave problema de saúde pública mundial. Estudos apontam para a associação de maus tratos com prejuízos cognitivos, comportamentais e neurobiológicos. O abuso sexual encontra-se entre os tipos mais comuns de maus tratos na infância. Este estudo se propõe a investigar a ocorrência de sintomatologia depressiva em crianças e adolescentes expostas a abuso sexual em comparação àquelas não expostas. Ademais, tem como objetivo investigar as diferenças quanto ao grau de sintomatologia depressiva em vítimas de abuso ocorrido dentro do núcleo familiar em comparação com o abuso sexual de ocorrência fora do contexto familiar. Participaram do estudo 85 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos de idade, sendo 28 parte do grupo controle, sem exposição (GNE - Grupo Não Exposto) e 57 do grupo exposto a abuso sexual (GAS), dos quais 30 perfizeram o grupo de abuso sexual intrafamiliar (GAS - INTRA) e 27 formaram o grupo de abuso sexual extrafamiliar (GAS - EXTRA). A avaliação incluiu uma entrevista clínica e uma ficha de dados sócio-demográficos respondidos pelo responsável legal da criança, uma entrevista clínica semiestruturada e o Inventário de Depressão Infantil (Children's Depression Inventory - CDI) respondidos pelas crianças. Quanto à presença de sintomas depressivos, foram encontradas diferenças significativas entre o grupo exposto e o controle ( $U = 408,5$  ;  $p < 0,001$  ;  $r = 0,3969$ ), observando-se escores aumentados no GAS (Mediana = 11), em relação ao GNE (Mediana = 7,5). Em relação ao grau de sintomatologia entre GAS-INTRA (Mediana = 11) e GAS-EXTRA (Mediana = 12), as diferenças não foram significativas ( $U = 357$  ;  $p = 0,447$  ;  $r = 0,102$ ). Desta forma, a ocorrência de abuso sexual encontrou-se associada a maior frequência de sintomas depressivos, demonstrando a necessidade de intervenções psicossociais para vítimas de abuso sexual. No entanto, em oposição às evidências da literatura, não foi verificado maior gravidade de sintomas depressivos em vítimas de abuso sexual intrafamiliar, quando comparados ao grupo de abuso extrafamiliar. Este resultado aponta para a necessidade de estudos futuros com aumento do tamanho amostral para verificar a confiabilidade deste resultado.