

## **Programa de Acompanhamento dos Pacientes Adultos com Tuberculose do HCPA**

Denise Rossato Silva; Marcos Vinícius Vieira Rocha; André Pedroso Lemos; Felipe Otesbelgue; Alice Mânica Müller; Erika Cavalheiro Skupien; Tássia Lazzari Kirchmann

Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de casos de TB. Grande parte da população ainda é diagnosticada em hospitais, com até 40% dos casos notificados. O intervalo de tempo entre a admissão e o início do tratamento em pacientes hospitalizados pode ser longo. As explicações para o atraso no diagnóstico podem ser a falta de reconhecimento dos sintomas de TB, além da inespecificidade dos sintomas ou achados radiológicos. O atraso no diagnóstico é um importante fator de risco para mortalidade e disseminação intra-hospitalar da TB. No HCPA pacientes com TB são atendidos na emergência, enfermarias e nos ambulatórios, especialmente os da Pneumologia. Aproximadamente 20% destes pacientes não procuram a unidade básica de saúde para prosseguir o tratamento, após o encaminhamento hospitalar. Neste Programa é realizada uma abordagem global quanto ao diagnóstico e tratamento precoces, além da prevenção do abandono do tratamento. Os acadêmicos vivenciam a prática profissional aliada aos conhecimentos da graduação. Esse Programa de Extensão não é limitado à prestação de serviços à comunidade na forma do atendimento ambulatorial/hospitalar, mas possibilita a execução concomitante de atividades de ensino e pesquisa.

Descritores: Tuberculose; Ambulatório; Hospital