



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

PADRÃO INEFICAZ DE ALIMENTAÇÃO DO LACTENTE

Alessandra Vaccari, Cristiane Raupp Nunes, **Denise Cardoso Berto**, Elenice Lorenzi Carniel, Giordana de Cássia Pinheiro da Motta, Jacqueline Fritscher Ramos Felix Moraes, Rozimeli Guedes dos Santos, Valdereza da Silva Ribeiro
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: O recém-nascido prematuro, durante sua admissão na Unidade de Internação Neonatal, recebe o diagnóstico de enfermagem “Amamentação Interrompida”, tendo como fator relacionado a doença da criança. O recém-nascido, que inicialmente recebia alimentação apenas via sonda, começa a receber dieta por via oral, seja por copinho, mamadeira ou seio materno. Entretanto, o diagnóstico “Amamentação Interrompida” não contempla os cuidados necessários para esta nova fase do recém-nascido, não sendo encontrado no sistema do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) um diagnóstico apropriado. O *Petit Comitê*, grupo de enfermeiros da neonatologia que se reúne sistematicamente para discutir os diagnósticos de enfermagem e realizar revisões sobre os cuidados relacionados, identificou a necessidade de trabalhar junto a Comissão do Processo de Enfermagem (COPE) um diagnóstico que atendesse esta população de bebês prematuros que iniciam suas dietas por via oral. **Objetivo:** Adequar os diagnósticos de enfermagem às diversas fases de alimentação do recém-nascido prematuro, propondo a inclusão de um novo diagnóstico de enfermagem e seus respectivos cuidados. **Método:** Pesquisa bibliográfica, cujas fontes utilizadas foram NANDA I, NIC, NOC e Sistema AGHWeb do HCPA. **Resultados:** Foi encontrado em NANDA I 2012-2014 o diagnóstico “Padrão Ineficaz de Alimentação do Lactente”, cuja definição é a *capacidade prejudicada de um lactente de sugar ou de coordenar a resposta sucção/deglutição, resultando em nutrição oral inadequada para as necessidades metabólicas*. Posteriormente, foram selecionado cuidados já presentes no Sistema AGHWeb que podem ser relacionados a este novo diagnóstico de enfermagem, também foi realizada uma revisão na literatura de mais alguns cuidados que deverão compor o cadastro do diagnóstico proposto. **Conclusões:** Os resultados estão sendo discutidos com os demais enfermeiros da UIN e encaminhados à COPE para inclusão no Sistema AGHWeb do HCPA. **Descritores:** Diagnóstico de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Prematuro.