



Evento	Salão UFRGS 2020: SIC - XXXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2020
Local	Virtual
Título	ALEITAMENTO MATERNO E HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS AOS DOZE MESES DE VIDA: DADOS PRELIMINARES
Autor	CHRISTIELLY SANTOS SILVEIRA DE PAIVA
Orientador	LEANDRO MEIRELLES NUNES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Autor: Christielly Santos Silveira de Paiva Orientador: Leandro M. Nunes

ALEITAMENTO MATERNO E HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS AOS DOZE MESES DE VIDA: DADOS PRELIMINARES

JUSTIFICATIVA: O aleitamento materno auxilia no desenvolvimento e no correto funcionamento das estruturas e funções orofaciais do lactente, já os hábitos orais deletérios atuam de forma prejudicial. **OBJETIVOS:** Descrever a ocorrência do aleitamento materno e dos hábitos orais deletérios (mamadeira, chupeta e sucção de dedo) no primeiro ano de vida de crianças saudáveis. **METODOLOGIA:** Estudo transversal aninhado a um ensaio clínico randomizado sobre métodos de introdução alimentar. Foram incluídos lactentes nascidos a termo com peso $\geq 2500g$, que não estivessem iniciado a introdução alimentar e sem comorbidades. Para esse momento foi respondido questionário online sobre aleitamento materno e hábitos orais deletérios pelas mães das crianças aos 12 meses de vida, elaborado para o presente estudo. Os dados foram tabulados e apresentados por meio de percentual relativo e absoluto, média e mediana. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (nº 36908). **RESULTADOS PARCIAIS:** Das 82 crianças, 58 (70,7%) estavam em aleitamento materno e as demais cessaram na média de $229,05 \pm 103,16$ dias. A mamadeira é utilizada por 51 (62,2%) crianças com a principal finalidade de oferecer outros tipos de leites em 27 dessas, e foi iniciada com uma mediana de 120 dias (min=0;máx=365). A chupeta é utilizada por 34 (41,5%) das crianças, foi introduzida principalmente pela mãe numa mediana de 30 dias (min=0;máx=380) e com a finalidade de 'acalmar' para a maioria delas (76,5%); é utilizada com frequência por 15 (44,1%) crianças, com mediana de 4 vezes ao dia (min=1;máx=10) e pelo tempo em mediana de 15 minutos (min=5;máx=125). A sucção do dedo é realizada por 11 (13,4%) crianças, mas de forma rara ou às vezes pela maioria (90,9%) delas, não havendo um padrão em relação ao dedo utilizado; o início deste hábito ocorreu na mediana de 60 dias (min=0;máx=240).