

CAUSAS DE CONDENAÇÕES PARCIAIS E TOTAIS DE CARÇAÇAS DE FRANGOS DE CORTE NOS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

Lucas Michel Wolf¹

Liris Kindlein²

A produção de carne de frango vem se destacando consideravelmente nas últimas décadas, especialmente pelo seu valor nutritivo e por possuir bom preço comercial. Além disso, o Brasil ocupa a terceira posição mundial na produção avícola e o primeiro lugar como exportador, o que legitima a importância econômica deste produto para o país. No entanto, algumas situações podem reduzir o potencial produtivo de granjas e abatedouros-frigoríficos, tais como as condenações parciais e totais de carcaças realizadas pelos programas de controle de alimentos de origem animal. Nesse sentido, este estudo objetivou identificar as principais causas de condenações totais e parciais relatadas no Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e na União Europeia. De acordo com a literatura, as principais causas de condenações parciais no Brasil são geralmente relacionadas ao manejo inadequado na criação ou no período pré-abate, como a contaminação de material fecal e biliar das carcaças de aves; contusões/fraturas oriundas de erros no processo de apanha dos animais; e celulite, ocorrida previamente por uma porta de entrada para microrganismos. Em relação as causas de condenações totais, destacam-se novamente a contaminação, a caquexia e o aspecto repugnante. No cenário internacional (Canadá, Estados Unidos da América e União Europeia) as condenações caracterizadas como tecnopatias são menos valorizadas pois não estão relacionadas com agentes patogênicos e conseqüentemente com riscos à saúde pública, outorgando esta responsabilidade para os programas de autocontrole das indústrias. Com isso, afecções cuja análise de risco seja alta ou média para a saúde do consumidor, são mais frequentes causas de condenações dos órgãos oficiais nestes países. Desse modo, destacam-se as causas de condenação total as afecções com comprometimento sistêmico, associadas a agentes patogênicos como celulite, aerossaculite e caquexia. Com base no exposto, os países considerados importantes na produção avícola possuem distintos critérios de condenações de carcaça de frango de corte.

¹ Aluno do curso de Medicina Veterinária – Bolsista de Extensão – lucaswolf503@gmail.com

² Orientadora – liris.kindlein@ufrgs.br