

257

MONITORAMENTO DE PERDAS REPRODUTIVAS EM OVINOS NO RS (RESULTADOS PARCIAIS). *Estevao de Oliveira Gamba, Norma Centeno Rodrigues, Luiz Alberto Oliveira Ribeiro (orient.) (UFRGS).*

No RS, nos últimos dois anos, a ovinocultura tem despertado novamente a atenção dos produtores devido a recuperação do preço da lã e pelos valores altos oferecidos a carne de cordeiros. Porém a economicidade do sistema de produção de cordeiros está fortemente associada a eficiência reprodutiva dos rebanhos. Existem poucos dados sobre os fatores que limitam a eficiência reprodutiva do rebanho ovinos gaúcho, em especial os dirigidos para a produção de cordeiros. Foram escolhido dois rebanhos nos quais foi avaliado, inicialmente, a condição corporal (CC) e após isso, foi feito o diagnóstico de gestação através de ultra-sonografia. Posteriormente será acompanhada a parição desses rebanhos quando será coletado o peso ao nascer, o número de cordeiros mortos e sua possível causa. Os casos de infertilidade e aborto serão estudados através de exame sorológico das fêmeas e exame histopatológico dos casos de aborto. Os resultados disponíveis até o momento mostram que no primeiro rebanho monitorado a CC média de 100 ovelhas, no encarneamento, foi $3,77 \pm 0,68$. Já no outro rebanho, de 176 ovelhas examinadas, por ultra-sonografia, a taxa de prenhes encontrada foi de 48,86%. (PROBIC).