

## Introdução

A Úlcera por Pressão (UP) gera grande desconforto ao paciente, além de ser uma complicação cara e desagradável na hospitalização. Em face deste contexto, este estudo tem por finalidade contribuir para o conhecimento do risco e da prevalência da UP, bem como para a qualificação deste indicador de qualidade assistencial de enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).


## Objetivos

- Identificar quais dos pacientes hospitalizados em risco para UP, avaliados pela Escala de Braden (EB) com escore  $\leq 13$ , desenvolveram esta complicação e quais deles tiveram registro no sistema informatizado de indicador de qualidade assistencial de UP do HCPA;
- Descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes que desenvolveram UP.

## Método

- **Tipo Estudo:** Transversal, recorte de um estudo maior.
- **Amostra:** 188 internações de pacientes adultos hospitalizados em unidades clínicas e cirúrgicas, no período de janeiro-julho de 2008.
- **Coleta de Dados:** retrospectiva, em banco de dados pré-existente; em prontuário eletrônico e papel (evoluções de enfermagem) e, em sistema informatizado de indicadores de qualidade assistencial.
- **Análise de Dados:** estatística descritiva, utilizando-se o programa SPSS versão 18.0.
- **Aspectos éticos:** projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição sob o protocolo número 11-0010.

## Resultados



- **Idade média:** 67 anos ( $\pm 23,2$ )
- **Tempo mediano da internação (em dias):** 11 ( $\pm 6-29$ )
- **Média do escore total na E. Braden :** 11
- **Motivos de internação/comorbidades (principais):** doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, geniturinárias, metabólicas e psiquiátricas.
- **Diagnósticos de Enfermagem (DEs) prioritários dentre os 27 identificados:**
  - Mobilidade física prejudicada (4º em frequência)
  - Síndrome do déficit do autocuidado (5º em frequência)
  - Integridade da pele prejudicada (7ª em frequência)
  - Integridade tissular prejudicada (10ª em frequência)
  - Risco para prejuízo da integridade da pele (12ª em frequência)
- **Principais fatores relacionados ao DE:** Prejuízo neuromuscular/ musculoesquelético e Imobilidade.
- **Principal intervenção de enfermagem:** “Implementar protocolo de prevenção e tratamento para UP” foi prescrita para os cinco DEs relacionados ao risco de dano à integridade da pele.
- **Sexo predominante feminino:** 12 (63%)
- **Local de internação dos pacientes:** unidades clínicas em 11(58%) casos

## Conclusão

- O Processo de enfermagem e os Indicadores de qualidade assistencial como a UP são ferramentas importantes à qualificação do cuidado de enfermagem. Todavia, necessitam ser utilizadas de forma aprimorada, visto que se constata no estudo uma subnotificação das UPs. Entretanto, este agravo pôde ser identificado a partir de registros nas evoluções de enfermagem, etapa importante do PE que é realizada de forma sistemática e qualificada na instituição.
- Como implicações à prática de enfermagem se destaca a necessidade de reorientar a equipe para o cuidado à prevenção da UP, com avaliação dos pacientes em risco para o agravo, o que remete à acurácia dos DEs e a implementação das intervenções mais adequadas. Além disto, a comunicação dos casos de UP no sistema de registro de indicador de qualidade assistencial é fundamental.