

Introdução: Psoríase é uma dermatose crônica que afeta primariamente a pele. Os sintomas de ardência, prurido e descamação interferem nas atividades e relações pessoais dos pacientes. Há relação da psoríase com tabagismo quanto à prevalência do hábito, desencadeamento e gravidade das lesões, assim como ocorrência maior de depressão e uso abusivo do álcool, com diminuição da qualidade de vida. **Objetivo:** Avaliar a associação entre psoríase e a presença de depressão, tabagismo e alcoolismo, a partir de sub-análise de estudo. **Métodos:** Estudo caso-controle incluindo pacientes com e sem psoríase atendidos no Ambulatório de Dermatologia do HCPA. Foram avaliados presença de depressão, tabagismo e alcoolismo por questionário. Uso atual ou prévio de antidepressivo foi considerado critério indicativo de depressão. **Resultados:** Analisaram-se 348 casos e 341 controles. Depressão (32% vs 19% $p < 0,001$), alcoolismo atual (5% vs 2% $p < 0,03$) e alcoolismo passado (6% vs 3% $p < 0,06$) foram mais relatados entre os casos. Pacientes que nunca ingeriram bebida alcoólica foram mais prevalentes entre os controles (89% vs 95% $p < 0,03$). Tabagismo atual foi mais observado entre os casos (22% vs 14% $p < 0,08$), assim como histórico de tabagismo passado (36% vs 24% $p < 0,02$). Pacientes não-tabagistas foram mais frequentes entre os controles (42% vs 62% $p < 0,01$). **Conclusão:** A maior prevalência de depressão, tabagismo e uso de bebidas alcoólicas em pacientes com psoríase em nosso meio confirma observações há longo tempo relatadas quanto à presença de comorbidades nos pacientes com psoríase. Isto também demonstra o impacto da doença sobre a saúde global de seus portadores. Destaca-se a importância da investigação de hábitos de vida diante da possível repercussão psicológica e do comprometimento sistêmico tardio nos psoriáticos.