

459

ASPECTOS CLÍNICOS DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO ADULTO E SUA RELAÇÃO COM O USO DE NICOTINA. *Gregory David Zeni, Paulo Silva Belmonte de Abreu (orient.) (UFRGS).*

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma entidade clínica caracterizada por sintomas de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade, cuja prevalência encontra-se em torno de 4% nos adultos. O TDAH predispõe ao abuso e dependência de nicotina visto que é mais prevalente a dependência de nicotina entre adultos com diagnóstico de TDAH (em torno de 42%) quando comparados com controles (26%). O objetivo deste projeto é verificar a relação entre o padrão de uso de nicotina e: a) a intensidade dos sintomas de TDAH; b) subtipos de TDAH; c) presença de comorbidades. MATERIAL E MÉTODOS Trata-se de um estudo transversal de associação, onde os dados coletados serão provenientes de uma amostra consecutiva por conveniência de adultos portadores de TDAH na infância e na idade adulta e tabagistas atuais ou no passado. A presença de TDAH é confirmada na idade adulta e na infância em entrevista estruturada através do Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age Children, Epidemiologic Version – K-SADS-E. Todos os pacientes respondem a um extenso protocolo demográfico e clínico, além de assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido reiterando a entrada livre e voluntária no estudo, bem como a liberdade para se retirar sem prejuízos. Os pacientes definidos como fumantes atuais ou no passado responderão o Questionário de Tolerância de Fagerstrom, que consiste em um instrumento auto-aplicável amplamente utilizado como medida para a dependência de nicotina. Os critérios de inclusão são: idade adulta (18-65 anos), portadores de diagnóstico de TDAH e tabagistas. Os critérios de exclusão são: doença neurológica significativa, psicose e retardo mental.