

066

ENSAIO ABERTO DE REBOXETINA EM PACIENTES OBESOS COM TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA. *Vanessa Cassina Zanatto, Ricardo Oliveira Silveira, Flavio Pereira Kapczinski (orient.) (UFRGS).*

Objetivos: Avaliar, através de um ensaio aberto, a efetividade e segurança da reboxetina, um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, no tratamento de pacientes obesos com TCAP. Métodos: Nove pacientes obesos ambulatoriais, com TCAP e sem nenhuma comorbidade psiquiátrica receberam reboxetina 8 mg/dia durante 12 semanas de tratamento. O número de dias com compulsão alimentar, a escala de compulsão alimentar periódica (ECAP), o peso corporal, o IMC e a escala de Impressão Clínica Global - Severidade (CGI-S) e Melhora (CGI-M) foram utilizados. Resultados: Cinco pacientes completaram o estudo. A média do número de dias com compulsão alimentar por semana modificou-se significativamente de $4,6 \pm 1,8$ para $0,2 \pm 0,6$ ao final do estudo ($p=0,0002$). A média dos escores da ECAP caiu de $32,3 \pm 6,32$ para $9,3 \pm 6,8$ ($p=0,0003$). Houve uma redução significativa do IMC de $36,5 \pm 4,48$ para $35,06 \pm 4,49$ ($p=0,01$) e na CGI-S de $5,1 \pm 0,92$ para $1,4 \pm 1,01$ ($p=0,0002$) e CGI-M de $2,8 \pm 0,6$ para $1,4 \pm 1,01$ ($p=0,0003$). Uma redução significativa do peso corporal (média=4,24 kg) também foi observada ($p=0,01$). Nenhum evento adverso sério foi observado. Conclusão: A reboxetina pode ser um agente efetivo e bem tolerado no tratamento do TCAP em pacientes obesos. (PIBIC).