

414

**ESTUDO COMPARATIVO MULTICÊNTRICO ENTRE OS DIAGNÓSTICOS, SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS UTILIZANDO O CRITÉRIO DE DIAGNÓSTICO EM PESQUISA PARA AS DESORDENS TÊMPORO-MANDIBULARES (RDC/DTM).** *Gabriela Galon Borges,**Marcio de Lima Grossi (orient.) (PUCRS).*

Os critério de Diagnóstico em Pesquisa para as Desordens Têmporo-mandibulares (RDC/DTM), originalmente foram desenvolvidos nos EUA. Este instrumento foi traduzido e utilizado para classificar pacientes com DTM no que se refere à diagnósticos físicos (Eixo I) e disfunção relacionadas à dor e condição psicológica (Eixo II) na Clínica de Oclusão da Faculdade de Odontologia da PUC -RS, Brasil. Os objetivos do estudo foram o de determinar se o processo de tradução resultaria em um instrumento de pesquisa diagnóstico válido e relatar os resultados iniciais quando o RDC/DTM foram comparados em uma realidade cultural diferente. Os resultados encontrados utilizando a versão Brasileira-Portuguêsa do RDC/DTM foram comparados com os resultados de um centro renomado de pesquisa nos EUA que gerou a maior parte dos dados usados para formular o RDC/DTM original. Até o presente momento, 37 novos pacientes foram consecutivamente incluídos no estudo. Cinco pacientes com artrite reumatóide e 3 adolescentes foram excluídos. Os remanescentes 29 participaram no estudo, sendo todos do sexo feminino. Neste estudo, somente os resultados do Eixo I foram comparados. Desordens musculares (Grupo I) foram diagnosticados em 67, 9% dos pacientes; desordens de deslocamento de disco (Grupo II) foram encontrado em 32, 1% dos pacientes nas articulações têmporo-mandibulares direita e esquerda, respectivamente. Estes resultados iniciais sugerem que o RDC/DTM é útil na classificação de pacientes com DTM e permitir uma comparação multicêntrica.