

197

COMPARAÇÃO DAS INCIDÊNCIAS DE TUMORES CUTÂNEOS MALIGNOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA AMBULATORIAL NO PACS NOS PERÍODOS DE 1998-1999 E 2000-2001.*Freiberger, MH; Dei Ricardi, LR; Paganella, RB; Koppe, D; Santos, RK; Dal'alba, C; Napp, G; Almeida, HC.*
(Departamento de Cirurgia/ FAMED- UFRGS).

Os tumores malignos de pele são os mais freqüentes na oncologia clínica. Na sua etiologia, encontramos tanto fatores individuais, como cor da pele e história familiar, quanto fatores ambientais, como exposição prolongada aos raios solares (UVA e UVB) e a produtos químicos. É freqüente o número de cirurgias ambulatoriais para remoção desses tumores. Esse trabalho visa comparar exames anatomopatológicos obtidos em pacientes submetidos a cirurgias ambulatoriais em um posto de atendimento primário (PAM-3) nos anos de 1998 e 1999 com os de 2000 e 2001. O material foi examinado em dois laboratórios conveniados ao PAM-3. No período de 1998-1999 foram analisados um total de 85 tumores malignos, sendo, 77 (90,5%) carcinomas basocelulares, 6 (7%) carcinomas epidermóides e 2 (2,5%) melanomas. Já em 2000 e 2001 foram analisados um total de 84 anatomopatológicos, sendo 65 (77,4%) carcinomas basocelulares, 12 (14,3%) carcinomas epidermóides e 7 (8,3%) melanomas.